

კლინიკური შემთხვევები ბავშვთა
განვითარება

კლინიკური შემთხვევა 1

- დედას ვიზიტზე მოყავს 3 თვის გოგონა. ქალს ორსულობის პერიოდში რამდენჯერმე ჰქონდა საშოდან სისხლდენის ეპიზოდი, რის გამოც დანიშნული ჰქონდა წოლითი რეჟიმი.
- ბავშვი დაიბადა გესტაციის 34-ე კვირაზე, დაბადებისას წონა იყო 2100 გრამი. ბავშვმა არ იტირა დაბადებისთანავე და გადაიყვანეს ახალშობილთა განყოფილებაში, სადაც დარჩა 7 დღის განმავლობაში.
- ამჟამად დაბარებულია მეთვალყურეობის ვიზიტზე, როგორც რისკის ჯგუფის ჩვილი. განსაზღვრეთ მისი განვითარების რისკფაქტორები.

კლინიკური შემთხვევა 2

- თქვენ სინჯავთ 10 თვის ბიჭუნას. ბავშვი დაიბადა დროული, დაბადებისას წონა იყო 3,300 გრამი. იტირა დაბადებისთანავე და არ აღენიშნებოდა რაიმე ტიპის ნორმიდან გადახრა.
- ბავშვის დედა მოიხმარდა ალკოჰოლს ორსულობის პერიოდში. დედა დეპრესიულია, არ უნდოდა დაორსულება და დამაბული ურთიერთობები აქვს ბავშვის მამასთან.
- მშობლები მუდმივად ჩხუბობენ და ზოგჯერ გადადიან ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე.
- ბიჭუნა ადვილად ღიზიანდება და ხშირად ტირის. ბავშვზე მეთვალყურეობას აწარმოებთ გეგმიური ვიზიტის ფარგლებში. განსაზღვრეთ ბიჭუნას განვითარების რისკფაქტორები.

კლინიკური შემთხვევა 3

- თქვენ სინჯავთ 2 თვის ბიჭუნას. დაიბადა დროული, 3800 გრამი, მშობიარობისას პათოლოგიას ადგილი არ ჰქონია.
- დედას არ ჩატარებია პრენატალური მეთვალყურეობა ორსულობის პერიოდში.
- ბავშვი გამოეწერა სამშობიაროდან 24 საათში.
- ბინაზე ყოფნის მეორე დღეს დედამ შეამჩნია, რომ ბავშვი „ყვითელია“. დედას ურჩიეს, დაეწვინა ბავშვი მზეზე დილის საათებში, მაგრამ ბავშვის მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა.
- მისი სიმპტომები გაუარესდა მე-5 დღეს, ბავშვს განუვითარდა გულყრა და ის გადაიყვანეს საავადმყოფოში. ბავშვი იმყოფებოდა ახალშობილთა განყოფილებაში 20 დღის მანძილზე, სადაც უტარებდნენ ფოტოთერაპიას და ორჯერ გადაუსხეს სისხლი.
- ეს ინფორმაცია მოგაწოდათ დედამ, რადგანაც საავადმყოფოდან ცნობა არ გამოუტანებიათ.
- ბიჭუნა ოჯახში მესამე შვილია. დედა გეუბნებათ, რომ მისი მეორე შვილი გარდაიცვალა 1 კვირის ასაკში და ისიც ძალიან ყვითელი იყო. განსაზღვრეთ ბავშვის განვითარების რისკფაქტორები.

კლინიკური შემთხვევა 4

- თქვენ მეთვალყურეობას უწევთ 2 წლის გოგონას, რომელიც არ ლაპარაკობს. მის დედ-მამას 6 შვილი ჰყავს. დედა მუშაობს და ბავშვს ხშირად უტოვებს მის 9 და 10 წლის და-ძმას.
- გოგონას მამა ალკოჰოლზე დამოკიდებულია, რის გამოც ოჯახში ხშირად უსიამოვნებაა. 8 თვის ასაკში გოგონა სერიოზულად ავად იყო მაღლი სიცხითა და გულყრებით, რის გამოც იმყოფებოდა საავადმყოფოში 2 კვირის განმავლობაში.
- გოგონას დედა ორსულობის პერიოდში ღებულობდა მიზოპროსტოლის აბებს, რადგანაც არ უნდოდა კიდევ ერთი შვილი და სურდა მედიკამენტური აბორტის გამოწვევა.
- დაადგინეთ გოგონას განვითარების რისკფაქტორები და მოახდინეთ მათი კლასიფიცირება.

განვითარების შეფასების კლასიფიკაცია 2 თვემდე ასაკში

ნიშნები	კლასიფიცირება
<ul style="list-style-type: none"> * თავის გარშემოწერილობა < -2Z ან > +2Z * სახეზეა 3 ან მეტი ფენოტიპური ცვლილება * ჩვილს არ აქვს ერთი ან მეტი რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, რომელიც შეესაბამება წინა ასაკობრივ ჯგუფს (1 თვემდე ასაკის ბავშვისთვის გამოიყენეთ ბავშვის კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის ნიშანსვეტები) 	<p style="text-align: center;">განვითარების საექვო შეფერხება</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ჩვილს აქვს მისი ასაკისთვის შესაბამისი ყველა რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, მაგრამ სახეზეა განვითარების ერთი ან მეტი რისკფაქტორი 	<p style="text-align: center;">ნორმალური განვითარება რისკფაქტორებით</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ჩვილს არ აქვს ერთი ან მეტი რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, რომელიც შეესაბამება მის ასაკობრივ ჯგუფს (1-დან 2 თვემდე ჩვილებისთვის) 	<p style="text-align: center;">განვითარების გამაფრთხილებელი ნიშანი</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ჩვილს აქვს მისი ასაკისთვის შესაბამისი ყველა რეფლექსი/პოზიცია/უნარი და სახეზე არ არის განვითარების რისკფაქტორები 	<p style="text-align: center;">ნორმალური განვითარება</p>

განვითარების შეფასების გამოსავლების მართვა 2 თვემდე ასაკში კლასიფიკაციის მიხედვით

განვითარების საექვო შეფერხება	* გააგზავნეთ ჩვილი ნევროლოგიური და ფსიქომოტორული შეფასებისთვის
ნორმალური განვითარება რისკფაქტორებით ან განვითარების გამაფრთხილებელი ნიშანი	<ul style="list-style-type: none"> * მიეცით დედას ჩვილის განვითარების ხელშესაწყობი რეკომენდაციები * დაგეგმეთ განმეორებითი შეფასება 2 კვირაში * გააფრთხილეთ დედა საშიშროების ნიშნების შესახებ, როდესაც საჭირო იქნება ვიზიტზე დაბრუნება 2 კვირაზე ადრე
ნორმალური განვითარება	<ul style="list-style-type: none"> * შეაქეთ დედა * მიეცით დედას რეკომენდაცია გააგრძელოს ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა * დაგეგმეთ მომდევნო ვიზიტი რუტინული მეთვალყურეობის სქემის მიხედვით * გააფრთხილეთ დედა საშიშროების ნიშნების შესახებ, როდესაც საჭირო იქნება ვიზიტზე დაბრუნება დაგეგმილზე ადრე.

განვითარების შეფასების კლასიფიკაცია 2 თვიდან 6 წლამდე

ნიშანი	კლასიფიკაცია
<ul style="list-style-type: none"> * თავის გარშემოწერილობა $< -2Z$ ან $> +2Z$ * სახეზეა 3 ან მეტი ფენოტიპური ცვლილება * ჩვილს არ აქვს ერთი ან მეტი რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, რომელიც შეესაბამება წინა ასაკობრივ ჯგუფს 	<p>განვითარების საექვო შეფერხება</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ჩვილს აქვს მისი ასაკისთვის შესაბამისი ყველა რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, მაგრამ სახეზეა განვითარების ერთი ან მეტი რისკფაქტორი 	<p>ნორმალური განვითარება რისკფაქტორებით</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ჩვილს არა აქვს ერთი ან მეტი რეფლექსი/პოზიცია/უნარი, რომელიც შეესაბამება მის ასაკობრივ ჯგუფს 	<p>განვითარების გამაფრთხილებელი ნიშანი</p>
<ul style="list-style-type: none"> * ბავშვს აქვს მისი ასაკისთვის შესაბამისი ყველა რეფლექსი/პოზიცია/უნარი და სახეზე არ არის განვითარების რისკფაქტორები 	<p>ნორმალური განვითარება</p>

განვითარების შეფასების გამოსავლების მართვა 2 თვიდან 6 წლამდე კლასიფიკაციის მიხედვით

განვითარების საექვო შეფერხება	* გააგზავნეთ ჩვილი ნევროლოგიური და ფსიქომოტორული შეფასებისთვის
ნორმალური განვითარება რისკფაქტორებით ან განვითარების გამაფრთხილებელი ნიშანი	<ul style="list-style-type: none"> * მიეცით დედას ჩვილის განვითარების ხელშესაწყობი რეკომენდაციები * დაგეგმეთ განმეორებითი შეფასება 30 დღეში * გააფრთხილეთ დედა საშიშროების ნიშნების შესახებ, როდესაც საჭირო იქნება ვიზიტზე დაბრუნება 1 თვეზე ადრე
ნორმალური განვითარება	<ul style="list-style-type: none"> * შეაქეთ დედა * მიეცით დედას რეკომენდაცია გააგრძელოს ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა * დაგეგმეთ მომდევნო ვიზიტი რუტინული მეთვალყურეობის სქემის მიხედვით * გააფრთხილეთ დედა საშიშროების ნიშნების შესახებ, როდესაც საჭირო იქნება ვიზიტზე დაბრუნება დაგეგმილზე ადრე.