

ტესტ-კითხვარი

მსმენელის სახელი გვარი

- π ტესტი შესრულდა სასწავლო პროგრამის დაწყებამდე
- π ტესტი შესრულდა სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ

1. ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ყველაზე ხშირად რომელი სიმპტომი ვლინდება სხვამხრივ ჯანმრთელ ქალებში საშარდე გზების გაურთულებელი ინფექციების შემთხვევაში?
 - a) შარდვის გახშირება და მოშარდვის იმპერატიული სურვილი
 - b) ცხელება
 - გ) ბოქვეზედა მტკივნეულობა
 - d) გულისრევა და ღებინება
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი უროპათოგენებიდან ყველას აქვს ნიტრატების ნიტრიტებად გარდაქმნის უნარი, გარდა:
 - a) *Escherichia coli*
 - b) *Proteus spp*
 - c) *Klebsiella pneumoniae*
 - d) *Staphylococcus saprophyticus*
3. საშარდე გზების ინფექციებისაგან დამცველ ფაქტორებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა
 - a) თუთიით მდიდარი პროსტატის სეკრეტი
 - b) პერიურეთრალური ფლორის ლაქტობაცილები
 - გ) შარდის ბუშტისა და ურეთრაში ბაქტერიების მიმაგრების უნარის მქონე რეცეპტორების სიმცირე
 - d) ნონოქსოლინ-9 სპერმიციდის გამოყენება
4. ნიტროფურანტონის შესახებ ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან მართებულია ყველა, გარდა
 - a) მისი გამოყენება უსაფრთხოა ლაქტაციის დროს
 - b) მისი გამოყენება დასაშვებია, როდესაც კრეატინინის კლირენსი < 40მლ/წთ-ში
 - გ) ახასიათებს მოქმედების სპეციფიკური სპექტრი
 - d) ზოგავს ნაწლავის ფლორას
5. ქვემოთ ჩამოთვლილი მედიკამენტებიდან ყველა მიეკუთვნება აშშ ორსულებში საკვებისა და მედიკამენტების მოხმარების B კატეგორიას, გარდა
 - a) ნიტროფურანტონი
 - b) ციპროფლოქსაცინი
 - გ) ამოქსიცილინი
 - d) ცეფპოდოქსიმი

6. რეპროდუქციული ასაკის არაორსულ ქალებში ან ჯანმრთელ ხანდაზმულებში ასიმპტომური ბაქტერიურია:
- a) საჭიროებს მკურნალობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილია შარდის ბუშტის ინსტრუმენტული გამოკვლევა ან ქირურგიული ჩარევა
 - b) საჭიროებს აქტიურ მკურნალობას, სგი-ის გართულებების თავიდან ასაცილებლად
 - გ) ერადიკაციისთვის საჭიროებს 14 დღიანი ანტიმიკრობული მკურნალობის კურსს
 - დ) ზრდის პიელონეფრიტის რისკს
7. თუ პიურიას თან ახლავს დიზურია და საშარდე გზების ინფექციების სხვა სიმპტომები, შარდის 1 მლ-ში ბაქტერიების რა რაოდენობა ადასტურებს საშარდე გზების ინფექციის დიაგნოზს
- ა) 10^2
 - ბ) 10^3
 - გ) 10^4
 - დ) 10^5
8. როგორია ორსულებში ასიმპტომური ბაქტერიურიის გამოვლენისთვის შარდის შუალედური პორციის გამოკვლევის მგრძობელობა?
- a) 50%
 - ბ) 60%
 - გ) 70%
 - დ) 80%
9. საშარდე გზების გაურთულებელი ინფექციების სამკურნალოდ, რეციდივის თავიდან აცილებისა და ბაქტერიურიის კორეგირების მიზნით ტრიმეტოპრიმ-სულფამეტოქსაზოლითა და ქინოლონებით მკურნალობის კურსის მინიმალური ხანგრძლივობაა:
- a) ერთჯერადი დოზის მიღება
 - ბ) სამ დღიანი კურსი
 - გ) ოთხიდან შვიდ დღემდე მკურნალობის კურსი
 - დ) სულ მცირე შვიდი დღე
10. რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს 45 წლის სხვაგვარი ჯანმრთელი ქალბატონის მკურნალობის კურსი მწვავე პიელონეფრიტის გამო:
- a) 3-5 დღე
 - ბ) 5-7 დღე
 - გ) 7-10 დღე
 - დ) სულ მცირე 14 დღე

საშარდე გზების ინფექციების მართვა პირველადი ჯანდაცვის ქსელში
საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი

სწორი პასუხები ტესტებზე:

1. პასუხი-ა
2. პასუხი-დ
3. პასუხი: დ
4. პასუხი: ბ
5. პასუხი: ბ
6. პასუხი: ა
7. პასუხი: ა
8. პასუხი: დ
9. პასუხი: ბ
10. პასუხი: გ