

## ხანდაზმულებში სმენის დაქვეითებაზე სკრინინგი

### პროტოკოლი №2

**მიზანი:** ხანდაზმულებში სმენის დაქვეითების შემთხვევების დროული იდენტიფიცირება.

#### რესურსი:

პრაქტიკის ექთანი;  
უბნის ექთანი;  
ოჯახის/უბნის ექიმი.

#### მატერიალური:

1. ხანდაზმულთა ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასების ბარათი;
2. პაგარა ზომის მექანიკური საათი.

#### ორგანიზაციული ასპექტები:

1. სმენის დაქვეითებაზე სკრინინგი განიხილება, როგორც ხანდაზმულთა რეგულარული სამედიცინო მეთვალყურეობის კომპონენტი;
2. სმენის დაქვეითებაზე სკრინინგს ატარებს:
  - ა) ზოგადი პრაქტიკის ექთანი სამ წელიწადში ერთხელ 65 წლის ბემოთ ასაკისა და წელიწადში ერთხელ 75 წლის ბემოთ ასაკის პირებში, ვინც მომართავს დაწესებულებას რეგულარული სამედიცინო შემოწმებისათვის;
  - ბ) უბნის ექთანი ლოგინს მიჯაჭვულ პაციენტებში, ვისთვისაც ამბულატორიული ვიზიტის შესრულება შეუძლებელია.
3. სკრინინგის შედეგებს ექთანი აფიქსირებს ხანდაზმულთა სამედიცინო მეთვალყურეობის ბარათის სათანადო გრაფაში.

#### პროცესი:

სმენის შეფასებისათვის რეკომენდებულია შემდეგი ტესტები:

#### 1. ჩურჩულით სმენის შეფასების ტესტი

ინსტრუქცია:

დადებით პაციენტისაგან 30-60 სმ-ის მანძილზე. სთხოვეთ მას, ხელით დაიფაროს მეორე ყური. ამოისუნთქეთ და შემდეგ დაიჩურჩულეთ ძალიან ხმადაბლა. გაზარდეთ ხმის სიძლიერე მანამ, სანამ პაციენტი სწორად არ გაიმეორებს ნათქვამი სიტყვების, სულ მცირე, 50%-ს. გამოიყენეთ როგორც ერთ, ისე ორმარცვლიანი სიტყვები. გაიმეორეთ მეორე ყურზე.

ნორმა	გადახრა ნორმიდან
შეუძლია ნაზი ჩურჩულის გაგონება 30-დან 60-სმ მანძილზე. თანაბრად ორივე მხარეს.	აღინიშნება ცალმხრივი რეაქცია ან არათანაბარი ორმხრივი რეაქცია. სიტყვებს გამეორება ხმის აწევამდე შეუძლებელია.

## საათის წიკწიკის ტესტი

**ინსტრუქცია:** მოათავსეთ მოწიკწიკე საათი ყურიდან 2-5 სმ-ში. დაუფარეთ პაციენტს მეორე ყური. გაიმეორეთ მეორე მხარეს.

ნორმა	გადახრა ნორმიდან
2-5სმ-ში შეუძლია წიკწიკის გაგონება.	მაღალი ხარისხის სმენაწუნგობისას პაციენტს არ ესმის წიკწიკი.

თუკი დადგინდება სმენის დაქვეითება, საჭიროა პაციენტის მიმართვა ოჯახის/უბნის ექიმთან, რომელიც განსაზღვრავს მომდევნო მოქმედების გეგმას (იხ. სენსორული დისფუნქციის მართვის გაიდლაინი).

### გამოსაგალი:

1. ექთანმა გამოავლინა სმენის დაქვეითების X შემთხვევა (ამბულატორიულად/ბინამე);
2. ექთანმა სმენის დაქვეითების გამო ოჯახის ექიმთან/ან პირველადი ჯანდაცვის ღონის დაწესებულების ოტოლარინგოლოგთან გაგზავნა X პაციენტი;
3. შემდგომი გამოკვლევებისათვის გაგზავნილი პაციენტების რაოდენობა.